XVI CONGRESSO NAZIONALE

Siena 9 - 10 ottobre

UP-TO-DATE NELL'OSTEOPOROSI E NELLE MALATTIE
DELL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

PRESIDENTE GISMO

Ranuccio Nuti

PRESIDENTI CONGRESSO

Bruno Frediani - Stefano Gonnelli

Linee guida vs Nota 96

Stefano Gonnelli

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Sorted by: Most recent ↓

MY NCBI FILTERS

87,061 results

RESULTS BY YEAR

TEXT AVAILABILITY

- Abstract
- Free full text
- Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- Associated data

ARTICLE TYPE

- Books and Documents

[CYP24A1 expression analysis in uterine leiomyoma regarding MED12 mutation profile.](#)

1
Cite Fazeli E, Piltan S, Gholami M, Akbari M, Falahati Z, Yassaee F, Sadeghi H, Mirfakhraie R.
Arch Gynecol Obstet. 2020 Oct 6. doi: 10.1007/s00404-020-05825-7. Online ahead of print.
Share PMID: 33025089

Recent studies have revealed the role of hypovitaminosis **D** as a major risk factor in the disease development. CYP24A, a mitochondrial enzyme that catalyzes the degradation of 1,25(OH)(2)**D**(3,) is reported to be over-expressed in several human cancers. ...CONCLUSION: ...

[Serum **Vitamin D** and Depressive Symptomatology among Boston-Area Puerto Ricans.](#)

2
Cite Sahasrabudhe N, Lee JS, Scott TM, Punnett L, Tucker KL, Palacios N.
J Nutr. 2020 Oct 6:nxaaa253. doi: 10.1093/jn/nxaa253. Online ahead of print.
Share PMID: 33025014

BACKGROUND: Low **vitamin D** status, assessed using serum 25-hydroxyvitamin **D** [25(OH)**D**] concentration, has been associated with depression, but research among minority populations, such as Puerto Ricans is limited. ...We conducted sensitivity analyses in ...

[Increasing the uptake of **vitamin D** supplement use in Australian residential aged care facilities: results from the **vitamin D** implementation \(ViDAus\) study.](#)

3

Stato Vitaminico D

➤ Incidenza di livelli sierici di Vitamina D < 20 ng/ml

Prevalenza dell'ipovitaminosi D nella popolazione italiana

❖ 76% delle donne italiane con > 70 aa aveva livelli sierici di 25OHD < 12 ng/ml al termine del periodo invernale

❖ 36% delle donne italiane (età media 35 aa) aveva livelli sierici di 25OHD < 20 ng/ml

Rachitismo

Il *rachitismo* è una patologia caratterizzata da una ridotta mineralizzazione del tessuto osseo in accrescimento, con conseguente accumulo di matrice ossea non mineralizzata, detta tessuto osteoide

Rachitismo - Birmingham in 19° secolo

Rachitismo nel 21° secolo

Principali localizzazioni
delle fratture patologiche
e delle pseudofratture di
Looser-Milkman

Carenza di vitamina D

Ipovitaminosi D

Riduzione dell'assorbimento intestinale di Ca

Riduzione della calcemia

Aumento del PTH

Aumento del turnover osseo ed in particolare
del riassorbimento osseo

OSTEOPOROSI

Vitamin D: not just the bone. Evidence for beneficial pleiotropic extraskeletal effects.

Immune system	> 40 ng/mL
<ul style="list-style-type: none"> ↑ macrophage differentiation and activation ↑ cathelicidin, β2-defensin ↓ Th₁, Th₁₇ cells ↑ Treg cells <p>ward off: - type 1 diabetes - hashimoto's thyroiditis - inflammatory bowel disease - multiple sclerosis</p>	
Muscle	> 40 ng/mL
<ul style="list-style-type: none"> ↑ protein synthesis, trophism and contractile efficiency ↓ myostatin 	
Adipose tissue	> 40 ng/mL
<ul style="list-style-type: none"> ⊖ weight gain induced by high-fat diet ↑ adiponectin ↓ leptin, resistin and PPAR_γ ⊕ glucose homeostasis ↑ fatty acid oxidation, mitochondrial metabolism and energy expenditure 	
Glucose metabolism: β-cell function and peripheral insulin sensitivity	> 40 ng/mL
<ul style="list-style-type: none"> ↑ insulin synthesis and secretion ↑ expression of insulin receptors ↑ PPAR_δ 	

Bone
≥ 30 ng/mL

Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis

1 October 2018 Lancet Diabetes Endocrinol 2018

Mark J Bolland, Andrew Grey, Alison Avenell

“In summary, vitamin D supplementation did not have meaningful effects on fracture, falls, or bone mineral density, and future trials are unlikely to alter these conclusions. We believe there is no justification for more trials of vitamin D supplements with musculoskeletal outcomes because there is no longer equipoise about the effects of vitamin D on these outcomes.”

Use of antiosteoporotic drugs and calcium/vitamin D in patients with fragility fractures: impact on re-fracture and mortality risk

Luca Degli Esposti¹ · Anna Girardi¹ · Stefania Saragoni¹ · Stefania Sella⁴ · Margherita Andretta² · Maurizio Rossini³ · Sandro Giannini⁴ · on the behalf of the Study group

- Pz **non trattati** hanno un rischio superiore del **55,6%** per ri-frattura rispetto ai pazienti trattati con farmaci anti-osteoporosi.
- Pz che assumono Ca/VitD hanno **avuto un rischio di ri-frattura inferiore del 64,4%** rispetto ai pz trattati senza supplementazione.

Use of antiosteoporotic drugs and calcium/vitamin D in patients with fragility fractures: impact on re-fracture and mortality risk

Luca Degli Esposti¹ · Anna Girardi¹ · Stefania Saragoni¹ · Stefania Sella⁴ · Margherita Andretta² · Maurizio Rossini³ · Sandro Giannini⁴ · on the behalf of the Study group

- Pz **non trattati** hanno un rischio superiore del **36%** per la mortalità rispetto ai pazienti trattati con farmaci anti-osteoporosi.
- Pz che assumono Ca/VitD hanno **avuto un rischio di mortalità inferiore del 47.1%** rispetto ai pz trattati senza supplementazione.

The associations between serum 25-hydroxyvitamin D level and the risk of total fracture and hip fracture

Y. Feng¹ · G. Cheng¹ · H. Wang¹ · B. Chen¹

- ❖ Valori inferiori a 20 ng/ml (50 nmol/l) sono indicativi di un aumento del 40% del rischio di frattura di femore per ogni calo di una DS dei valori di 25(OH)D

Farmaci per l'osteoporosi, consumo (DDD/1000 abitanti die) per categoria terapeutica e per sostanza: confronto 2014-2019

Sottogruppi e sostanze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ % 19-18	
Vitamina D e analoghi	13,0	14,2	15,9	17,5	19,3	19,7	2,3	
Farmaci anabolici	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,7	
Bifosfonati da soli	6,9	6,7	6,6	6,7	6,7	6,9	2,2	
Anticorpo monoclonale	1,0	1,6	2,1	2,4	2,7	3,1	11,4	
Bifosfonati in associazione	3,5	3,3	3,0	2,7	2,4	2,2	-8,4	
Calcio	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,1	
Serm - modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-2,9	
Farmaci a doppia azione	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	
Farmaci per l'osteoporosi	26,3	27,6	29,3	31,0	32,9	33,6	2,2	
colecalfiferolo	5,6	7,2	9,1	10,9	12,6	13,4	5,7	+ 130%
teriparatide	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,7	
denosumab	1,0	1,6	2,1	2,4	2,7	3,1	11,4	
acido alendronico	2,9	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	6,3	
acido alendronico/colecalfiferolo	3,5	3,3	3,0	2,7	2,4	2,2	-8,4	
calcio/colecalfiferolo	5,7	5,3	5,1	4,9	4,7	4,3	-8,6	
risedronato	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	-1,4	
calcitriolo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,7	
calcifediolo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	30,6	
acido ibandronico	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	-6,2	

- 12.6 %

NOTA 96

Farmaci inclusi nella Nota AIFA:

- colecalciferolo
- colecalciferolo/Sali di calcio
- calcifediolo

La prescrizione a carico del SSN dei farmaci con indicazione “**prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D**” nell’adulto (>18 anni) è limitata alle seguenti condizioni:

Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nei seguenti scenari clinici :

indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D

- persone istituzionalizzate
- donne in gravidanza o in allattamento
- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia remineralizzante (vedi nota 79)

previa determinazione della 25(OH) D (vedi algoritmo allegato)

- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate)
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante per le quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia *
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D
- malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto

* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D.

Key points

- ❖ Qual è il valore di 25OHD che definisce una condizione di deficit di Vitamina D
- ❖ A chi, come e quando effettuare uno screening per il deficit di vitamina D
- ❖ Come trattare il deficit di Vitamina D
- ❖ Se e come valutare l'efficacia del trattamento con Vitamina D

Definizione dello Stato Vitaminico D: carenza

Interpretazione							
nmol/L	ng/mL	SIOMMMS	ES	NAM / NIH	AGS ¹	SACN	NOS
<25	<10	Grave carenza	Carenza	Carenza	Carenza	Carenza	Carenza
25-50	10-20	Carenza	Carenza	Rischio di inadeguatezza ²	Carenza	Sufficienza ³	Rischio di inadeguatezza ²
50-75	20-30	Insufficienza	Insufficienza	Sufficienza	A rischio di carenza	Sufficienza ³	Sufficienza
75-125	30-50	Concentrazione desiderabile	Concentrazione desiderabile	Sufficienza	Concentrazione minima accettabile	Sufficienza ³	Sufficienza
125-250	50-100	Possibile insorgenza di eventi avversi	Concentrazione desiderabile	Possibile eccesso di eventi avversi	Possibile insorgenza		
250-375	100-150	Possibile insorgenza di eventi avversi		Possibile eccesso di eventi avversi	Possibile insorgenza		
>375	>150	Intossicazione			Tossicità		

AGS (American Geriatrics Society), USA; ES (Endocrine Society), USA; NAM (National Academy of Medicine (precedentemente denominata Institute of Medicine, IOM), USA; NIH (National Institute of Health), USA; NOS (National Osteoporosis Society), UK; SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition), UK; SIOMMMS (Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo, delle Malattie dello Scheletro).

DEFINIZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

	DEFICIT	ADEGUATO
POPOLAZIONE GENERALE	< 20 ng/ml <50 nmol/l	20 -50 ng/ml 50-125 nmol/l
POPOLAZIONE A RISCHIO*	< 30 ng/ml <75 nmol/l	30-50 ng/ml 75-125 nmol/l

- Un valore < 10ng /ml (25nmol/l) è associato a rachitismo e osteomalacia, se di lunga durata
- I valori riportati come cut-off vanno considerati con un margine di variabilità del $\pm 10\%$, considerando la variabilità analitica del dosaggio della 25(OH)D e la variabilità stagionale dei livelli di 25(OH)D
- Si consideri un dosaggio eseguito a fine inverno/inizio primavera
- La popolazione a rischio è quella riportata nella tabella e quella sottoposta a qualunque terapia per riduzione del rischio di frattura

NOTA 96

Diagramma di Flusso

Livelli di 25 (OH D)		
0 – 12 ng/mL (0-30 nmol/L)	13-20 ng/mL (30-50 nmol/L)	>20 ng/mL (50 nmol/L)
<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose cumulativa di 300.000 UI somministrabile in un periodo massimo di 12 settimane, suddivisibili in dosi giornaliere, settimanali o mensili (non oltre le 100.000 UI/dose per motivi di sicurezza)</p>	<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose giornaliera di 750-1.000 UI o in alternativa dosi corrispondenti settimanali o mensili.</p>	<p>Considerare altre possibili cause dei sintomi. Con l'eccezione di patologie ossee riconosciute, la supplementazione con vitamina D non è raccomandata e pertanto non rimborsata dal SSN.</p>
<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps 2 volte al mese</p>	<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps/mese</p>	

Verifica dei livelli della 25OH D a tre mesi nel caso non vi sia risoluzione del quadro clinico di partenza

La supplementazione con vitamina D, dopo la eventuale fase intensiva iniziale di 3 mesi, prevede:

- l'interruzione del trattamento a correzione avvenuta dei sintomi da carenza salvo ricomparsa degli stessi
- la prosecuzione per tutta la durata delle terapie remineralizzanti,
- la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti col metabolismo della vitamina D (antiepilettici etc.)
- la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e malattia di Paget

Documento congiunto SIBioC, SIOMMMS, ELAS Italia, AME relativo alla nota Aifa 96 sulla prescrivibilità dei farmaci per la carenza di Vitamina D, e raccomandazioni per la refertazione

Ruggero Dittadi^{1,a,b}, Sabrina Corbetta^{2,3,a}, Giuseppe Banfi^{2,4,a}, Francesco Bertoldo^{5,a}, Silvia Migliaccio^{6,a}, Stefano Gonnelli^{7,a}, Maurizio Rossini^{5,c}, Marco Migliardi^{8,b}, Antonio Fortunato^{9,b}, Fabio Vescini^{10,d}, Andrea Palermo^{11,d}, Cristina Vassalle^{12,a}, Silvia Gelsumini^{13,a}, Giovanni Lombardi^{2,14,a,c}

A nome di:

- Gruppo di Studio inter-societario “Marcatori biochimici del turnover del tessuto osseo e del tessuto muscolare”, SIBioC-SIOMMMS (Società Italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro)
- European Ligand Assay Society-Italia (ELAS Italia)
- Associazione Medici Endocrinologi (AME)

- indicare esplicitamente nel referto il metodo utilizzato per la determinazione
- utilizzare le unità di misura SI (nmol/L), eventualmente accompagnate per un congruo periodo di tempo dalla espressione del risultato nelle unità di misura tradizionali (ng/mL)
- identificare i valori atti ad orientare la valutazione dello status del soggetto

• <50 nmol/L (<20 ng/mL)	<i>valori insufficienti</i>
• 50-75 nmol/L (20-30 ng/mL)	<i>valori non ottimali, in relazione a possibili comorbilità associate</i>
• >75 nmol/L (>30 ng/mL)	<i>valori ottimali</i>

Key points

- ❖ Qual è il valore di 25OHD che definisce una condizione di deficit di Vitamina D
- ❖ A chi, come e quando effettuare uno screening per il deficit di vitamina D
- ❖ Come trattare il deficit di Vitamina D
- ❖ Se e come valutare l'efficacia del trattamento con Vitamina D

Nella popolazione generale* va dosato il livello di 25(OH) D?

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕	<ul style="list-style-type: none">• Non esistono evidenze che il dosaggio della 25(OH)D nella popolazione generale* comporti alcun vantaggio• si raccomanda di non eseguirla• Il rapporto costo /beneficio non è definito	STRONG AGAINST (Recommended against)

* La popolazione non inclusa nella categorie a rischio

Il dosaggio delle 25(OH)D va effettuato nei soggetti con condizioni o patologie associabili a ipovitaminosi?

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕	Si suggerisce di non dosare i livelli di 25(OH)D indiscriminatamente nei pazienti con condizioni/patologie associabili a ipovitaminosi D	WEAK AGAINST (Suggested against)
⊕⊕	Si raccomanda il dosaggio dei livelli di 25(OH)D solo quando risulti indispensabile nella gestione clinica del paziente (diagnostica differenziale o terapia)	STRONG FOR (Recommended for)

Va dosata la 25(OH) D nei pazienti in terapia antiriassorbitiva per la riduzione del rischio di frattura?

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕⊕⊕⊕	<ul style="list-style-type: none"> • Si raccomanda di non dosare basalmente la 25(OH)D ove sia prevista una terapia con farmaci per riduzione del rischio fratturativo 	<p>Strong against (Recommended against)</p>
⊕	<ul style="list-style-type: none"> • Si suggerisce di verificare i livelli di 25(OH)D (insieme ad altri indici) dopo 3-6 mesi dall'inizio della supplementazione • Ulteriori valutazioni non sono necessarie 	<p>Weak for (Suggested)</p>

NOTA 96

Diagramma di Flusso

Diagramma di flusso applicabile a persone > 18 anni per la **determinazione della 25OH Vit D**

La flowchart non è applicabile nelle seguenti condizioni per le quali è indicata una valutazione specialistica:

- insufficienza renale (eGFR<30 mmol/L),
- urolitiasi,
- ipercalcemia,
- sarcoidosi,
- neoplasie metastatiche, linfomi,

NB: La determinazione dei livelli di 25OHD NON deve essere intesa come procedura di screening è NON è indicata obbligatoriamente in tutte le possibili categorie di rischio.

(adattato da NICE 2018)

1. Esiste almeno un sintomo persistente fra quelli elencati suggestivo per carenza di vitamina D ?
 - Sintomi di osteomalacia come dolenzia in sedi ossee o dolore (anche pulsante) lombosacrale, pelvico o agli arti inferiori; senso di impedimento fisico; dolori o debolezza muscolare (anche di grado elevato) soprattutto ai quadricipiti ed ai glutei con difficoltà ad alzarsi da seduto o andatura ondeggiante;
 - Dolori diffusi di lunga durata;
 - Propensione alle cadute immotivate.
2. È prevista una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D (ed es. antiepilettici, glucocorticoidi, anti-retrovirali, anti-micotici, colestiramina, orlistat etc.) oppure esiste una condizione di malassorbimento (ad es. fibrosi cistica, celiachia, m. Crohn, chirurgia bariatrica, etc) ?
3. Esiste una patologia ossea accertata (osteoporosi, osteomalacia o malattia di Paget) che può beneficiare dal trattamento con vitamina D oppure necessita di terapia remineralizzante?
4. Esiste un riscontro di PTH elevato con calcemia normale o bassa?

↓ **SI**

È appropriata la prescrizione di una determinazione della 25(OH) D.
Nell'interpretazione dei risultati considerare che il laboratorio potrebbe NON condividere i medesimi intervalli di normalità.

↓ **NO**

La determinazione della 25(OH) D, NON è appropriata.

Key points

- ❖ Qual è il valore di 25OHD che definisce una condizione di deficit di Vitamina D
- ❖ A chi, come e quando effettuare uno screening per il deficit di vitamina D
- ❖ Come trattare il deficit di Vitamina D
- ❖ Se e come valutare l'efficacia del trattamento con Vitamina D

La popolazione generale* va supplementata con vitamina D?

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕⊕⊕	<p>Non vi sono effetti favorevoli certi, né su mortalità, né su outcome scheletrici o extrascheletrici.</p> <p>Non esistono evidenze di vantaggi nel rapporto costo/beneficio</p> <p>Nella popolazione generale* si raccomanda di non somministrare vitamina D</p>	<p>STRONG AGAINST</p> <p>(Recommended against)</p>

* La popolazione non includibile nella categorie a rischio

Quale Dose di Vitamina D per la Supplementazione

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕ ⊕	<ul style="list-style-type: none">•Non esiste un dose unica e fissa per tutti i soggetti che devono essere supplementati•La dose di supplementazione può variare da 800 UI/die a 2000 UI/die di colecalciferolo	Weak for (suggested)

Va sempre assicurato un adeguato intake calcico.

Qual' è il Regime Migliore per la Somministrazione del Colecalciferolo?

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕	<ul style="list-style-type: none">• Non esiste al momento evidenza sul regime ideale• Si consiglia una schedula di somministrazione quotidiano, settimanale, mensile o ogni 2 mesi in base alla dose somministrata.• La dose singola massima somministrabile può raggiungere e non superare i 100.000 UI	WEAK FOR (Suggested)

NOTA 96

Farmaci inclusi nella Nota AIFA:

- colecalciferolo
- colecalciferolo/Sali di calcio
- calcifediolo

La prescrizione a carico del SSN dei farmaci con indicazione “**prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D**” nell’adulto (>18 anni) è limitata alle seguenti condizioni:

Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nei seguenti scenari clinici :

indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D

- persone istituzionalizzate
- donne in gravidanza o in allattamento
- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia remineralizzante (vedi nota 79)

previa determinazione della 25(OH) D (vedi algoritmo allegato)

- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate)
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante per le quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia *
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D
- malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto

* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D.

NOTA 96

Diagramma di Flusso

Livelli di 25 (OH D)		
0 – 12 ng/mL (0-30 nmol/L)	13-20 ng/mL (30-50 nmol/L)	>20 ng/mL (50 nmol/L)
<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose cumulativa di 300.000 UI somministrabile in un periodo massimo di 12 settimane, suddivisibili in dosi giornaliere, settimanali o mensili (non oltre le 100.000 UI/dose per motivi di sicurezza)</p>	<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose giornaliera di 750-1.000 UI o in alternativa dosi corrispondenti settimanali o mensili.</p>	<p>Considerare altre possibili cause dei sintomi. Con l'eccezione di patologie ossee riconosciute, la supplementazione con vitamina D non è raccomandata e pertanto non rimborsata dal SSN.</p>
<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps 2 volte al mese</p>	<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps/mese</p>	

Verifica dei livelli della 25OH D a tre mesi nel caso non vi sia risoluzione del quadro clinico di partenza

La supplementazione con vitamina D, dopo la eventuale fase intensiva iniziale di 3 mesi, prevede:

- l'interruzione del trattamento a correzione avvenuta dei sintomi da carenza salvo ricomparsa degli stessi
- la prosecuzione per tutta la durata delle terapie remineralizzanti,
- la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti col metabolismo della vitamina D (antiepilettici etc.)
- la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e malattia di Paget

Pazienti candidati a una terapia inibitori del riassorbimento osseo con rapido e importante effetto sul turnover osseo

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica (2)	Forza della raccomandazione clinica
⊕	E' consigliabile l'uso di una dose di carico iniziale seguita dalla dose di mantenimento per evitare rischio di ipocalcemie anche sintomatiche.	STRONG FOR (Recommended)

Va sempre assicurato un adeguato intake calcico.

Pazienti con epatopatie, malassorbimento intestinale o in trattamento con farmaci che interferiscono con il metabolismo epatico della vitamina D

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
⊕	<ul style="list-style-type: none">• Si consiglia la supplementazione con almeno 2000 UI/die di colecalciferolo nei pazienti con grave insufficienza epatica o in caso di terapie croniche che interferiscono con il metabolismo epatico della vitamina D• É consigliabile come alternativa l'uso di calcifediolo• I benefici superano chiaramente i rischi	WEAK FOR (Suggested)

Obesity and overweight decreases the effect of vitamin D supplementation in adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Lara Fonseca de Oliveira¹ · Lucas Guimarães de Azevedo¹ · Jerusa da Mota Santana² ·
Luanna Pimenta Carlos de Sales¹ · Marcos Pereira-Santos³

- Aumento della prevalenza dell'ipovitaminosi D all'aumentare del BMI in quanto vitamina liposolubile verrebbe sequestrata nel tessuto adiposo
- Riduzione della concentrazione della 25(OH) vitamina D pari all' 1.15% per ogni aumento del BMI di 1 Kg/m².

Calcifediol

- Oral calcifediol results in a more rapid increase in serum 25OHD compared to oral cholecalciferol.
- Oral calcifediol is more potent than cholecalciferol, so that lower dosages are needed.
- Oral calcifediol has a higher rate of intestinal absorption and this may have important advantages in case of decreased intestinal absorption capacity due to a variety of diseases.
- A potential additional advantage of oral calcifediol is a linear dose-response curve, irrespective of baseline serum 25OHD, whereas the rise in serum 25OHD is lower after oral cholecalciferol, when baseline serum 25OHD is higher.
- Finally, intermittent intake of calcifediol results in fairly stable serum 25OHD compared with greater fluctuations after intermittent oral cholecalciferol.

Time profile of the response of serum 25(OH)D (ng/ml) to different dose regimens of calcidiol at various time points

Time profile of urinary calcium (mg/24 h) under different dose regimens of calcidiol at various time points

STUDIO SULLA FARMACOCINETICA DEL CALCIFEDIOLO (25OHD3) IN DONNE AFFETTE DA OSTEOPOROSI POSTMENOPAUSALE

- Studio monocentrico di farmacocinetica, in aperto, di fase IV, randomizzato con un rapporto 1:1, a gruppi paralleli, su pazienti di sesso femminile affette da osteoporosi postmenopausale.
- ❖ Un **braccio A** (25 donne):
28 gtt a settimana (pari a 140 mcg) di calcifediolo per sei mesi (=4 gtt die)
- ❖ Un **braccio B** (25 donne):
42 gtt a settimana (pari a 210 mcg) di calcifediolo per sei mesi (=6 gtt die)

STUDIO SULLA FARMACOCINETICA DEL CALCIFEDILOLO (25OHD3) IN DONNE AFFETTE DA OSTEOPOROSI POSTMENOPAUSALE

Key points

- ❖ Qual è il valore di 25OHD che definisce una condizione di deficit di Vitamina D
- ❖ A chi, come e quando effettuare uno screening per il deficit di vitamina D
- ❖ Come trattare il deficit di Vitamina D
- ❖ Se e come valutare l'efficacia del trattamento con Vitamina D

NOTA 96

Diagramma di Flusso

Livelli di 25 (OH D)		
0 – 12 ng/mL (0-30 nmol/L)	13-20 ng/mL (30-50 nmol/L)	>20 ng/mL (50 nmol/L)
<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose cumulativa di 300.000 UI somministrabile in un periodo massimo di 12 settimane, suddivisibili in dosi giornaliere, settimanali o mensili (non oltre le 100.000 UI/dose per motivi di sicurezza)</p>	<p>Prescrizione di: colecalfiferolo in dose giornaliera di 750-1.000 UI o in alternativa dosi corrispondenti settimanali o mensili.</p>	<p>Considerare altre possibili cause dei sintomi. Con l'eccezione di patologie ossee riconosciute, la supplementazione con vitamina D non è raccomandata e pertanto non rimborsata dal SSN.</p>
<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps 2 volte al mese</p>	<p>Prescrizione di: calcifediolo 1cps/mese</p>	

Verifica dei livelli della 25OH D a tre mesi nel caso non vi sia risoluzione del quadro clinico di partenza

La supplementazione con vitamina D, dopo la eventuale fase intensiva iniziale di 3 mesi, prevede:

- l'interruzione del trattamento a correzione avvenuta dei sintomi da carenza salvo ricomparsa degli stessi
- la prosecuzione per tutta la durata delle terapie remineralizzanti,
- la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti col metabolismo della vitamina D (antiepilettici etc.)
- la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e malattia di Paget

Monitoraggio dei livelli di 25(OH) nei pazienti con osteomalacia sintomatica o livelli di 25OHD < 10 ng/ml

Qualità dell'evidenza	Raccomandazione clinica	Forza della raccomandazione clinica
<p>⊕⊕</p>	<p>E' sufficiente una singola determinazione della 25(OH)D dopo il periodo stimato di normalizzazione dei livelli di 25(OH)D, preferibilmente nel periodo di UV-insufficienza, e comunque non prima di 3-6 mesi dall'inizio della supplementazione,</p> <p>Altri parametri come il PTH, la fosfatasi alcalina possono essere determinati per il monitoraggio biochimico della malattia.</p> <p>Non è opportuno ripetere tale determinazione una volta che i livelli desiderati sono stati ottenuti.</p>	<p>WEAK FOR</p> <p>(Suggested)</p>

Chi e come Trattare

La
supplementazione
con vitama D nel
paziente con IRC e
ridotti livelli di
25(OH)D

- ❖ Si raccomanda nel paziente con alterazioni del metabolismo minerale e osseo secondarie a malattia renale cronica (CKD-MBD) e ridotti livelli di 25(OH)D di correggere l'ipovitaminosi con **colecalciferolo** con le stesse modalità utilizzate nella popolazione generale con normale funzione renale.
- ❖ Si raccomanda di limitare l'uso di vitamina D attiva (**calcitriolo** o analoghi sintetici) ai soggetti in dialisi o nello stadio G4-G5 con severo e progressivo iperparatiroidismo

Chi e come Trattare

Pazienti con epatopatie,
malassorbimento intestinale o
in trattamento con farmaci che
interferiscono con il
metabolismo epatico della
vitamina D

- ❖ Si consiglia la supplementazione con almeno **2000 UI/die** di colecalciferolo nei pazienti con grave insufficienza epatica o in caso di terapie croniche che interferiscono con il metabolismo epatico della vitamina D
- ❖ É consigliabile come alternativa l'uso di calcifediolo
- ❖ I benefici superano chiaramente i rischi

Chi e come Trattare

Supplementazione con
vitamina D nel paziente con
iperparatiroidismo primitivo e
ipercalcemia lieve (< 12 mg/dl)
e vitamina D < 20 ng/ml

- ❖ Si consiglia nel paziente con iperparatiroidismo primitivo con carenza di vitamina D (25(OH)D < 20 ng/ml) ed ipercalcemia lieve (<12 mg/dl) supplementazione con basse dosi di colecalciferolo.
- ❖ L'obiettivo è di mantenere i livelli di 25(OH)D tra 20 e 30 ng/ml.
- ❖ I benefici superano chiaramente i rischi

Vitamin D in childhood and adolescence: an expert position statement

Giuseppe Saggese¹ • Francesco Vierucci² • Annemieke M. Boot³ •
Justyna Czech-Kowalska⁴ • Giovanna Weber⁵ • Carlos A. Camargo Jr⁶ • Eric Mallet⁷ •
Margherita Fanos¹ • Nick J. Shaw⁸ • Michael F. Holick⁹

- Vitamin D supplementation is recommended in all infants.
- Vitamin D supplementation should be started within the first days of life.
- Recommended vitamin D intakes for children and adolescents without risk factors for vitamin D deficiency are:
 - 400 IU/day during the first year of life
 - 600 IU/day after the first year of life (1–18 years)

- Recommended vitamin D intakes for infants, children, and adolescents with risk factors for vitamin D deficiency are:
 - **400–1,000** IU/day during the first year of life
 - **600–1,000** IU/day after the first year of life (1–18 years)

Nota 96

Possibili punti di forza

- Riduzione della spesa per la vitamina D e miglioramento dell'appropriatezza
- Identificazione delle categorie dei soggetti nelle quali può essere fatto lo screening dell'ipovitaminosi D
- Riconoscimento del dosaggio del 25OHD come indicatore affidabile dello stato vitaminico D e individuazione di un valore soglia (20 ng/ml) di sufficienza
- Definizione dei principi attivi utilizzabili per il trattamento del deficit

NOTA 96 – Monitoraggio andamento dei consumi della nota relativa alla vitamina D e analoghi

CONFEZIONI - VITAMINA D (IN NOTA e NON)

NOTA 96 – Monitoraggio andamento dei consumi della nota relativa alla vitamina D e analoghi

Differenze % rispetto al TRIMESTRE NOVEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 (POST NOTA 96)			TRIMESTRE NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 (ANNO PRIMA)		TRIMESTRE AGOSTO 2019 - OTTOBRE 2019 (3 MESI ANTECEDENTI)		
IN NOTA	ATC 5	Descrizione ATC 5	Numero confezioni	Spesa lorda	Numero confezioni	Spesa lorda	
NO	A11CC03	Alfacalcidolo	19,4%	24,5%	25,2%	27,8%	IN NOTA
NO	A11CC04	Calcitriolo	-4,4%	-4,2%	0,9%	1,4%	lorda mensile ATC media post 17.944.098
SI	A11CC05	Colecalciferolo	-37,2%	-35,1%	-32,3%	-31,9%	lorda mensile ATC media ante 27.017.527
SI	A11CC06	Calcifediolo	1,4%	3,2%	-1,9%	-3,8%	RISPARMIO MEDIO MENSILE 9.073.429
SI	A12AX	Colecalciferolo/Sali	-30,4%	-30,0%	-21,3%	-21,2%	NON IN NOTA
TOTALE ATC IN NOTA			-35,2%	-33,6%	-30,2%	-30,2%	lorda mensile ATC media post 1.912.468
TOTALE ATC NON IN NOTA			2,1%	7,2%	7,6%	12,1%	lorda mensile ATC media ante 1.783.877
							AGGRAVIO MEDIO MENSILE 128.592

DATI PER CLASSI DI ETA' – ATC IN NOTA 96

DATI TRIMESTRE NOVEMBRE 2019-GENNAIO 2020 (dato calcolato)

	CONFEZIONI FEMMINE	Delta confezioni % trimestre attuale vs trimestre anno precedente	LORDA FEMMINE	Delta confezioni % trimestre attuale vs trimestre anno precedente	CONFEZIONI MASCHI	Delta spesa % trimestre attuale vs trimestre anno precedente	LORDA MASCHI	Delta spesa % trimestre attuale vs trimestre anno precedente
TOTALE ITALIA	5.758.586	-34,9%	45.621.136	-32,8%	1.040.965	-32,6%	7.959.975	-31,6%
classi di età								
0-10	63.544	-11,2%	327.055	-11,4%	67.933	-12,5%	348.120	-12,7%
10-20	35.717	-29,0%	247.537	-30,9%	27.482	-26,7%	183.168	-29,3%
20-30	49.099	-40,2%	394.242	-39,4%	21.549	-37,6%	171.902	-36,5%
30-40	94.039	-39,8%	752.664	-38,9%	27.848	-37,9%	219.867	-37,0%
40-50	296.906	-42,8%	2.404.781	-41,6%	58.263	-39,0%	455.837	-38,0%
50-60	930.589	-42,1%	7.550.824	-40,3%	118.675	-36,3%	926.176	-35,5%
60-70	1.379.702	-37,7%	11.105.702	-35,3%	193.278	-35,7%	1.533.431	-34,1%
70-80	1.633.797	-32,9%	12.956.077	-30,3%	286.379	-33,8%	2.255.008	-32,1%
>80	1.275.203	-25,6%	9.882.254	-22,7%	239.558	-28,6%	1.866.466	-26,7%

NOTA 96 – Monitoraggio andamento dei consumi della nota relativa alla vitamina D e analoghi

NOTA 96 – Monitoraggio andamento dei consumi della nota relativa alla vitamina D e analoghi

CONFEZIONI - VITAMINA D (IN NOTA e NON)

NOTA 96 – Monitoraggio andamento dei consumi della nota relativa alla vitamina D e analoghi

DATI 9 MESI NOVEMBRE 19 - LUGLIO 20 (dato calcolato)

	CONFEZIONI FEMMINE	Delta confezioni % anno precedente	LORDA FEMMINE	Delta confezioni % anno precedente	CONFEZIONI MASCHI	Delta spesa % anno precedente	LORDA MASCHI	Delta spesa % anno precedente
TOTALE ITALIA	17.474.910	-35,8	139.077.080	-34,3	3.220.758	-33,8	24.926.457	-33,3

classi di età

0-10	156.469	-13,6	807.027	-13,6	168.223	-14,2	866.156	-13,9
10-20	99.176	-34,7	700.683	-36,5	74.740	-31,6	510.421	-33,6
20-30	155.564	-43,6	1.258.444	-43,3	69.535	-39,0	560.726	-38,8
30-40	294.922	-43,3	2.365.783	-43,2	87.286	-40,5	696.109	-40,1
40-50	903.698	-45,9	7.367.783	-45,2	180.315	-41,4	1.426.502	-40,9
50-60	2.790.263	-43,9	22.727.099	-42,7	374.847	-37,6	2.958.185	-37,2
60-70	4.161.138	-38,1	33.667.861	-36,3	610.928	-36,3	4.864.745	-35,5
70-80	4.958.677	-33,2	39.468.134	-31,3	896.537	-34,5	7.099.802	-33,3
>80	3.955.003	-25,1	30.714.267	-23,0	758.347	-28,7	5.943.811	-27,4

Osteoporotic fractures